

Juodligė (Sibiro opa)

Kodėl juodligė?

Juodligės sporos gali būti panaudotos kaip teroristinio išpuolio priemonė (įtartini vokai su milteliais ir pan.)

Kaip apsaugoti save ir aplinkinius?

Gavę įtartiną siuntinį (voką, paketą ir pan.) neatidarinėkite jo!
Paskambinkite pagalbos telefonu **112**



- Sukelia – sporas gaminanti bakterija
- Sporos dirvoje išlieka gyvybingos keletą metų
- Esant tinkamoms sąlygoms sporos virsta bakterijomis ir sukelia ligą
- Juodligė gali pasireikšti 3 formomis:
 - per odą
 - kvėpavimo takus
 - virškinamąjį traktą
- Šaltinis – sporomis užkrėsti gyvūninės kilmės produktai (pvz. vilna, termiškai neapdorota mėsa), dirvožemis
- Žmogus nuo žmogaus neužsikrečia
- Laikas nuo infekcijos patekimo iki pirmųjų simptomų 7 d.
- Didelė rizika užsikrėsti žmonėms esantiems juodligės paplitimo vietoje
- Profilaktika ir gydymas. Asmenims, įtariamiems užsikrėtus juodligės sporomis taikomas gydymas antibiotiniais preparatais, o taip pat skiepijimas.
- Skiepijimas nuo juodligės taikomas tik kai buvo / įtariama buvus sąlytis su juodligės sporomis (pvz. žmonėms buvusiems juodligės židinyje ir kt.)

- Simptomai priklauso nuo ligos formos:

– Odos forma

Sporos patenka per pažeistą odą dirbant su užkrėsta vilna, mėsa. Atsiranda niežtintis patinimas, po 1-2 d. – iškyla pūslelė, kuri virsta į skausmingą opą (1-3 cm. skersmens) su juoda dėme vidury

– Kvėpavimo takų forma

Prasideda paprasto peršalimo simptomais, po kelių dienų - dideliais kvėpavimo sutrikimais. Labai dažnai – mirtina

– Virškinamojo trakto

Ūmus virškinimo trakto uždegimas. Pykinimas, apetito stoka, vėmimas, karščiavimas, pilvo skausmai, vėmimas krauju, ūmus viduriavimas. Miršta 25-60 % atvejų.

Jeigu buvote juodligės plitimo vietoje ir pajutote minėtus simptomus:

- būtinai kreipkitės medicinos pagalbos
- nurodykite simptomus
- nurodykite, kad buvote vietoje, kur nustatyta juodligė ir kada ten buvote
- vykdykite visus specialistų nurodymus!